

衛生局 2019 年 1 月 29 日消息

## 衛生局收到 2 例麻疹確診病例報告

衛生局今日（1 月 29 日）收到 2 例麻疹確診病例報告，呼籲市民及未接種麻疹疫苗的嬰兒注意防範。

首例患者為 1 名 7 個月女嬰，本澳居民，於 1 月 22 日起出現發熱、咳嗽、流涕及結膜炎症狀，1 月 23 日出現全身皮疹，曾到私人醫療機構就診。1 月 25 日因症狀持續到鏡湖醫院急診就診並入院治療。1 月 29 日下午經衛生局公共衛生化驗所麻疹 IgM 抗體和麻疹 PCR 檢測呈陽性反應。女嬰在本澳出生，因未到接種年齡故未有進行麻疹疫苗接種，目前仍在隔離病房住院治療，已退熱，情況一般。另一例患者於疾病預防控制中心進行首例病人流行病學調查後發現，為首例母親，25 歲，外地僱員，於 1 月 14 日出現發熱、咳嗽、雙眼不適及皮疹等症狀，曾先後到私人醫療機構、仁伯爵綜合醫院急診及鏡湖醫院急診就診，目前已康復，1 月 29 日晚經衛生局公共衛生化驗所麻疹 IgM 抗體陽性反應。女嬰母親於潛伏期內曾多次帶同女嬰到珠海某室內嬰幼兒游泳館進行水療活動，根據活動情況及出現症狀的時間，列為成人患者麻疹輸入病例，兒童患者列為麻疹輸入相關病例。兩患者的其他同住家人暫沒有出現類似病徵。衛生局現正追蹤患者在私人醫療機構、仁伯爵綜合醫院急診及鏡湖醫院急診就診期間同一候診區候診的人士及其同住家人的健康狀況。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播，但也可通過直接接觸患者的口、鼻分泌物及受污染的物件傳染。潛伏期通常為 7 至 18 天，可長達 21 天。傳染期由出疹前 4 天持續至出疹後 4 天。以高熱（38°C 以上）、口腔粘膜斑（Koplik 斑）、全身性的皮膚斑丘疹、結膜炎、咳嗽和流涕等表現為特徵。通常皮疹於發病後第三天出現，最先見於耳後和面部，漸及頸、軀體及四肢，最後達手掌與足底，持續 4 至 7 天，疹退後有脫屑及色素沉著。麻疹具有很高的傳染性，未打疫苗或未感染者很易受到傳染，在疫苗覆蓋率不高的年代，是兒童極為常見的疾病。麻疹為自限性疾病，大部分病例為輕症，但可出現腦炎、肺炎等併發症；病死率 1/1000 至 1/100。

為保護自己的子女的健康，衛生局呼籲家長遵照衛生局之疫苗接種計劃按時為子女接種疫苗，並提醒市民注意防範：

1. 接種麻疹疫苗是預防感染麻疹最有效的方法，兒童應在 1 歲生日後至少接種 2 劑含預防麻疹的疫苗才完全免疫；
2. 不要帶未完全免疫的兒童外遊或到旅客聚集的地方；
3. 其他人士按需要接種麻疹疫苗，尤其是負責照顧嬰幼兒的人士，如家務助理、托兒所員工；
4. 注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、鼻、口；
5. 免疫力低者避免前往人多擠迫的地方或醫療場所；
6. 出現疑似症狀，應戴上口罩並及時就醫。

如有疑問，居民可瀏覽衛生局網頁(<http://www.ssm.gov.mo>)或致電熱線電話 28700800。