

衛生局 2019 年 2 月 6 日消息

衛生局收到一例麻疹輸入性病例報告

衛生局今日（2 月 6 日）收到一例麻疹輸入性病例報告，呼籲居民及未接種麻疹疫苗嬰兒的家長注意防範。

根據衛生局調查，患者為一名 33 歲女性，菲律賓籍外地僱員，於新濠天地工作，患者於 2 月 3 日上午出現發熱、咳嗽、咽痛症狀，同日中午到私人醫療機構就診，至同日下午 6 時左右出現皮疹，由面部擴散至胸部及四肢，其於 2 月 4 日凌晨再到仁伯爵綜合醫院急診就診，經衛生局公共衛生化驗所麻疹 IgM 抗體和麻疹 PCR 檢測呈陽性反應。據稱，患者未曾接種麻疹疫苗，患者目前仍在隔離病房住院治療，已退熱，情況一般。患者曾於 2019 年 1 月 19 日至 25 日獨自回菲律賓探親。患者於發病 2 日前開始沒有上班。根據旅遊史及出現症狀的時間，列為麻疹輸入病例，患者的同住朋友暫沒有出現類似病徵。衛生局現正追蹤患者發病前後接觸者的健康狀況。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播，但也可通過直接接觸患者的口、鼻分泌物及受污染的物件傳染。潛伏期通常為 7 至 18 天，可長達 21 天。傳染期由出疹前 4 天持續至出疹後 4 天。以高熱（38°C 以上）、口腔粘膜斑（Koplik 斑）、全身性的皮膚斑丘疹、結膜炎、咳嗽和流涕等表現為特徵。通常皮疹於發病後第三天出現，最先見於耳後和面部，漸及頸、軀體及四肢，最後達手掌與足底，持續 4 至 7 天，疹退後有脫屑及色素沉著。麻疹具有很高的傳染性，未打疫苗或未感染者很易受到傳染，在疫苗覆蓋率不高的年代，是兒童極為常見的疾病。麻疹為自限性疾病，大部分病例為輕症，但可出現腦炎、肺炎等併發症；病死率為千分之一至百分之一。

本澳已在 2014 年取得世衛組織認證為麻疹消除地區，但目前世界各地特別是內地、東南亞、南亞及歐洲等地仍存在麻疹流行。為保護自己的子女健康，衛生局呼籲家長遵照衛生局之疫苗接種計劃按時為子女接種疫苗，並提醒居民注意防範：

1. 接種麻疹疫苗是預防感染麻疹最有效的方法，兒童應在 1 歲生日後至少接種 2 劑含預防麻疹的疫苗才完全免疫；
2. 不要帶未完全免疫的兒童外遊或到旅客聚集的地方；

3. 其他人士按需要接種麻疹疫苗，尤其是負責照顧嬰幼兒的人士，如家務助理、托兒所員工；
4. 注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、鼻、口；
5. 免疫力低者避免前往人多擠迫的地方或醫療場所；
6. 出現疑似症狀，應戴上口罩並及時就醫。

如有疑問，居民可瀏覽衛生局網頁(<http://www.ssm.gov.mo>)或致電熱線電話28700800。