

衛生局 2019 年 3 月 4 日消息

衛生局錄得今年 2 月誘蚊產卵器指數高於過往同期 呼籲居民注意環境衛生 杜絕蚊蟲孳生

衛生局錄得今年 2 月全澳平均誘蚊產卵器指數為 7.9%，指數高於過往同期平均數值（2.0%）。衛生局表示，本年度截至今日（3 月 4 日）本澳錄得 3 宗輸入性登革熱病例。為防止登革熱等經蚊傳播疾病在本澳傳播，衛生局呼籲居民注意環境衛生，杜絕蚊蟲孳生，做好防蚊措施。

為掌握白紋伊蚊的戶外孳生活動及分佈情況，衛生局自 2002 年起常規放置誘蚊產卵器進行監測，現時全澳共有約 890 個誘蚊產卵器，衛生局每月會收集誘蚊產卵器統計陽性率並計算指數。根據今年 2 月的誘蚊產卵器指數，全澳平均的誘蚊產卵器指數為 7.9%，指數高於自 2002 年起同期的平均數值（2.0%），在澳門半島以海傍區及風順堂區最高，分別為 17.7%及 10.9%，在離島則以路環區最高，為 10.5%（見附表）。

澳門近日天氣回暖，有利白紋伊蚊生長，衛生局已聯同市政署開展一系列加強全澳的孳生源巡查清理工作和滅蚊工作。衛生局於今年 3 月起，加強於全澳街渠噴灑滅孑油劑的頻率由每月 1 次增加至每月 2 次，並根據各衛生黑點風險程度調整滅蚊次數，頻率由每月 1 次上調至每月 2 至 4 次不等；同時，亦會加強本澳陸路口岸區域的滅蚊工作。此外，衛生局人員亦會加強社區孳生源巡查工作，包括針對空置地盤及在建地盤等高風險場進行巡查工作。市政署亦於今年 3 月起，為轄下公園、休憩區、墳場、街市及小販區等 180 多個市政設施展開滅蚊工作，並將配合防控登革熱的工作適時增加滅蚊頻次。

有鑒於誘蚊產卵器指數高於過往同期平均數值，衛生局再次呼籲居民，注意環境衛生，清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。如前往登革熱流行地區，特別是東南亞國家，宜穿淺色長袖衫褲，在有空調或防蚊裝置的地方住宿，外出時使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬。不論是否有外遊史，如有發熱、出疹等疑似登革熱症狀，應使用驅蚊劑，並及時就醫，並告知醫生有關的居住地點或旅遊史。

同時，衛生局呼籲所有醫生留意疑似登革熱病人，如有懷疑，應及時作出申報和檢測。衛生局公共衛生化驗所已可為所有醫療機構提供登革熱免費檢測。居民如有疑問，可致電衛生局傳染病熱線 28700800 或瀏覽衛生局傳染病網頁 <http://www.ssm.gov.mo/csr/>。

附表：2019年2月全澳誘蚊產卵器指數

2月	筷子基區	黑沙環區	海傍區	風順堂區	塔石區	氹仔海洋區	氹仔湖畔區	路環區	機場	港珠澳大橋澳門口岸	全澳平均
誘蚊產卵器陽性率	9.4%	6.5%	17.7%	10.9%	5.4%	8.0%	4.8%	10.5%	5.3%	0	7.9%