

衛生局 2019 年 3 月 8 日消息

衛生局收到一例麻疹輸入病例報告

衛生局今日（3 月 8 日）收到一例麻疹輸入病例報告，呼籲居民及未接種麻疹疫苗的嬰兒家長注意防範。

根據衛生局疾病預防控制中心調查，患者為一名 38 歲男性，澳門居民，於新葡京任職莊荷。患者於 3 月 1 日出現發熱、流涕、咳嗽、咽痛及眼部不適等症狀，曾到其公司診所就診；3 月 3 日症狀持續並出現面頸部皮疹，曾到仁伯爵綜合醫院急診就診；3 月 6 日症狀加重，皮疹擴散至軀幹及四肢，再到鏡湖醫院急診就診並收入院治療。3 月 8 日經衛生局公共衛生化驗所檢測，其血液樣本麻疹 IgM 抗體和麻疹 PCR 檢測呈陽性反應。患者於內地出生，未曾接種麻疹疫苗，目前仍在鏡湖醫院隔離病房住院治療，仍有發熱，情況一般。患者於潛伏期內曾 2 次回中山沙溪家中並均留宿 1 晚。根據出現症狀的時間及旅遊史，列為麻疹輸入病例。患者的澳門同住家人暫沒有出現類似病徵。衛生局現正追蹤患者發病期間曾接觸人士的健康狀況。

本澳今年至今，已錄得 3 宗輸入和 2 宗輸入相關病例，而去年全年則錄得 3 宗輸入性病例，但無輸入相關病例。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播，但也可通過直接接觸患者的口、鼻分泌物及受污染的物件傳染。潛伏期通常為 7 至 18 天，可長達 21 天，傳染期由出疹前 4 天持續至出疹後 4 天。以高熱（38°C 以上）、口腔粘膜斑（Koplik 斑）、全身性的皮膚斑丘疹、結膜炎、咳嗽和流涕等表現為特徵。通常皮疹於發病後第三天出現，最先見於耳後和面部，漸及頸、軀體及四肢，最後達手掌與足底，持續 4 至 7 天，疹退後有脫屑及色素沉著。麻疹具有很高的傳染性，未打疫苗或未感染者很易受到傳染，在疫苗覆蓋率不高的年代，是兒童極為常見的疾病。麻疹為自限性疾病，大部分病例為輕症，但可出現腦炎、肺炎等併發症，病死率千分之一至百分之一。

本澳已在 2014 年取得世衛組織認證為麻疹消除地區，但目前世界各地包括，特別是內地、東南亞、南亞及歐洲等地仍存在麻疹流行。基於上述麻疹流行地區與本澳往來密切，而本澳現有大量外僱人員，特別是家傭主要來自菲律賓和

越南等地，衛生局呼籲僱主應留意來自有關地區的家傭，如接種記錄不明確應為其安排接種麻疹疫苗。在澳工作的非本地居民除可在私營醫院自費接種外，亦可在衛生中心及衛生站付費接種，接種時需出示身份證明文件、衛生局使用者卡及相關工作證明文件，無衛生局使用者卡請聯絡衛生中心辦理。

為保護自己和子女的健康，衛生局呼籲家長遵照衛生局之疫苗接種計劃按時為子女接種疫苗，並提醒市民注意防範：

1. 接種麻疹疫苗是預防感染麻疹最有效的方法，兒童應在 1 歲生日後至少接種 2 劑含預防麻疹的疫苗才完全免疫；
2. 不要帶未完全免疫的兒童外遊或到旅客聚集的地方；
3. 其他人士按需要接種麻疹疫苗，尤其是負責照顧嬰幼兒的人士，如家務助理、托兒所員工；
4. 注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、鼻、口；
5. 免疫力低者避免前往人多擠迫的地方或醫療場所；
6. 出現疑似症狀，應戴上口罩並及時就醫。

如有疑問，居民可瀏覽衛生局網頁(<http://www.ssm.gov.mo>)或致電熱線電話 28700800。