

衛生局 2019 年 5 月 10 日消息

沙特阿拉伯新增 36 宗中東呼吸綜合徵確診病例

根據世界衛生組織最新通告，證實沙特阿拉伯由 3 月 1 日至 4 月 8 日新增 36 宗中東呼吸綜合徵確診病例。根據資料指出，11 名患者來自利雅德市(Riyadh)，11 名來自東部省(Eastern Region)，3 名來自阿哈薩市(Al Ahsa)，2 名來自阿西爾省(Asir)，2 名來自奈季蘭市(Najran)，其餘 7 名患者分別來自蓋西姆省(Al Qassim)、塔伊夫市(Al Taif)、吉贊市(Jazan)、吉達市(Jeddah)、麥地那市(Madinah)、麥加市(Makkah)及北部省(Northern)；28 男 8 女，年齡由 22 歲至 80 歲，有 12 人死亡；患者中 12 人在發病前曾接觸確診患者，9 人曾接觸駱駝或飲用未經處理的駱駝奶。

根據世界衛生組織資料，截至 5 月 9 日，全球錄得的中東呼吸綜合徵冠狀病毒感染個案已增至 2,419 例，其中至少 836 例死亡。受影響的中東國家包括沙特阿拉伯、卡塔爾、約旦、阿聯酋、阿曼、科威特、也門、黎巴嫩和伊朗。而美國、法國、德國、英國、義大利、西班牙、希臘、荷蘭、阿爾及利亞、奧地利、土耳其、埃及、突尼斯、馬來西亞、菲律賓、中國、泰國、韓國和巴林均有病例報告，這些病例都和中國國家有直接或間接的關係。

中東呼吸綜合徵病毒感染早期有發熱、咳嗽等呼吸道症狀，病情可迅速惡化，並有很高的死亡率，免疫力較低的慢性病患者和老人較易感染，症狀可能不典型。目前資料顯示，該病毒的來源和傳播途徑仍未確定，病毒可能存在於出現較多病例的國家的動物（如駱駝）身上，病毒可通過人和人之間的密切接觸傳染，已有多宗醫院中病人和病人之間以及病人和醫務人員之間傳播的案例。故此，對所有急性呼吸道感染症狀的患者進行護理時，應採取飛沫傳播預防措施；而對中東呼吸綜合徵冠狀病毒極可能或確診病例施行護理時，更應採取接觸傳播預防和保護眼睛；進行可能產生氣霧的操作時，應採取空氣傳播預防措施。

衛生局已加強對不明原因肺炎和群集性呼吸道感染的監測，至今未見任何異常。衛生局提醒前線醫務人員保持警惕，特別是對來自或曾往中東旅行的人士。發現可疑病例應及時通報，採取相應的感染控制措施；居民外遊，特別是前往中東地區時，應注意：

- 個人和食物衛生；

- 往人多擁擠的地方前可考慮配戴口罩；
- 避免到當地醫院或接觸當地患病的人士；
- 避免接觸動物特別是駱駝及到農場；
- 避免飲食未經適當處理的飲料（如駱駝鮮奶）和食物；
- 外遊回澳後，如有不適，應及早就醫，並向醫生詳述旅行史。

有關中東呼吸綜合徵冠狀病毒的詳細資料，可查閱衛生局網站(中文 <http://www.ssm.gov.mo/portal/csr/ch/main.aspx> ， 葡 文 <http://www.ssm.gov.mo/Portal/csr/pt/main.aspx>) 或致電衛生局熱線 28700800 查詢。