

衛生局2019年7月11日消息

衛生局接獲 1 例恙蟲病個案報告

衛生局今日（7月11日）接獲 1 例恙蟲病（Tsutsugamushi Disease），又稱叢林斑疹傷寒（Scrub Typhus）個案。

患者為 1 名 27 歲男性，菲律賓籍外地僱員，於某園林綠化工程公司任職園丁，患者 6 月 30 日出現發熱症狀，7 月 9 日到仁伯爵綜合醫院急診就診，體檢時發現左中腹有一結痂性潰瘍。根據症狀和體徵，臨床診斷為恙蟲病，現於仁伯爵綜合醫院急診留觀治療。患者於 2019 年 1 月起由菲律賓到澳門工作，工作地點不固定，於潛伏期間主要在水塘馬路巴士站附近山林除草工作。患者於潛伏期間無外遊史，目前病情穩定。至今，其同事及同住友人無出現類似病徵。

恙蟲病由恙蟲病立克次體（*Rickettsia tsutsugamushi*）引起的急性傳染病。恙蟲病在西太區包括韓國、中國、日本、菲律賓等呈地方性流行。動物宿主有嚙齒類、哺乳類（羊、豬、狗、貓）、鳥類等，其中以嚙齒類中鼠類為主。恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，宿主遭具傳染性的恙蟎幼蟲叮咬，經由其唾液使宿主感染立克次體。人常因在草叢中活動而受到帶有恙蟲病立克次體的恙蟎叮咬而感染。不會直接由人傳染給人。病徵包括發燒、頭痛、肌肉疼痛以及皮膚出疹，特徵性表現是在恙蟲咬過的位置形成無痛性洞穿式潰瘍性焦痂。目前尚無有效疫苗，服用抗生素能有效治療。

衛生局呼籲市民採取以下措施，以減少被恙蟲病立克次體感染的風險：

1. 避免暴露於可能有恙蟎孳生的草叢中；到野外草叢中活動時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位塗抹含 DEET 之避蚊蟲劑；
2. 離開草叢環境後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎的附著和叮咬；
3. 剷除家居附近或其他人經常活動區域的雜草以消除恙蟎孳生地；除草時需做好個人防護措施；
4. 採取措施避免鼠類孳生；
5. 若出現疑似症狀，應盡快找醫生診治。