

# 大量輸血資料登記表

## 病人基本資料

姓名(中文)：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

姓名(英文)：\_\_\_\_\_ 住院編號：\_\_\_\_\_ 性別： 男  女

## 大量輸血計劃資料

啟動大量輸血計劃日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

大量出血的種類： 創傷  手術  胃腸道出血  產後  其它 \_\_\_\_\_

如屬創傷： 穿刺傷  挫傷  其它 \_\_\_\_\_

輸血前生命體徵：血壓 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg；心率：\_\_\_\_\_ /min

影像學的出血體徵： 未做  沒有  有 (部位：\_\_\_\_\_)

血小板數：\_\_\_\_\_  $\times 10^9$  / L；凝血酶原時間：\_\_\_\_\_ Sec (正常對照：\_\_\_\_\_ Sec)

部分凝血酶原時間：\_\_\_\_\_ Sec；纖維蛋白原：\_\_\_\_\_ g / L

## 啟動大量輸血計劃的原因

- 病人 3 小時內失血量超過血容量的 50%
- 每分鐘出血量達 150ml
- 24 小時內輸注 >10 單位濃縮紅血球
- 1 小時內輸注 > 4 單位濃縮紅血球
- 其它：\_\_\_\_\_

## 該次大量輸血計劃所使用的血液成分和數量

濃縮紅細胞：\_\_\_\_\_ 單位 新鮮冰凍血漿：\_\_\_\_\_ 單位

濃縮血小板：\_\_\_\_\_ 單位 (治療單位<sup>1</sup>) 低溫沉澱物：\_\_\_\_\_ 單位 (治療單位<sup>2</sup>)

使用幫助止血的藥物： 沒有  有 (藥物名稱：\_\_\_\_\_)

病人預後： 病情改善  危殆  死亡  其它：\_\_\_\_\_

醫生姓名(清晰)：\_\_\_\_\_ 部門：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_ 填寫日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 濃縮血小板治療單位：

成人：1 個血小板治療單位相當於 4 個隨機濃縮血小板、1 個匯集濃縮血小板或單採濃縮血小板；

兒童：體重<10kg:以 10ml/kg 輸注量為 1 個治療單位；>10 kg：4 個隨機濃縮血小板為 1 個治療單位。

<sup>2</sup> 低溫沉澱物治療單位：

成人 1 個低溫沉澱物治療單位相當於 10 個低溫沉澱物或 2 個匯集低溫沉澱物；

兒童：體重< 10kg: 以 4ml/kg 輸注量為 1 個治療單位；11-25kg: 2.5 個低溫沉澱物；>25kg:5 個低溫沉澱物



# 大量輸血指引

