

澳門特別行政區政府衛生局HPV疫苗免費接種對象及方式

人群類別 (首劑接種年齡)	劑數及間隔	接種方式
10至14歲女性居民 (小六級女學生)	兩劑 (第0, 6個月)	在澳就讀小六級女學生由衛生中心安排在學校集體接種，未能參加集體接種者需自行前往衛生中心接種。
15至17歲女性居民	三劑 (第0, 2, 6個月)	衛生局繼續為1995年9月1日後出生18歲及以上的女性居民提供HPV疫苗免費接種，有關計劃將在2018年5月31日終止，希望在該日期前完成3劑接種的人士，應在2017年11月30日前開始第1劑接種，因第一劑與第三劑最少間距為六個月。
1995年9月1日後出生18歲及以上的女性居民	三劑 (第0, 2, 6個月)	

澳門特別行政區政府 人類乳頭狀瘤病毒HPV疫苗 免費接種計劃

免費接種對象：
18歲以下澳門女性居民



健康澳門
UM LAR FELIZ
MACAU SAUDÁVEL
幸福家園

澳門健康城市 MACAU CIDADE SAUDÁVEL



傳染病諮詢熱線：28 700800

www.ssm.gov.mo/vaccine



澳門特別行政區政府衛生局

Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

人類乳頭狀瘤病毒HPV疫苗（俗稱子宮頸癌疫苗）已於2013年9月1日列入澳門特別行政區防疫接種計劃。

接種方式如下：

1. 疫苗常規接種對象為本澳小學六年級女學生，將由衛生中心派員到學校進行集體接種。未能參加學校集體接種的人士，需自行前往衛生中心接種。
2. 未能按常規接種程序接種的人士的新接種程序^{註(1)}，由衛生局在技術指引中訂定。

註(1)：

衛生局繼續為1995年9月1日後出生18歲及以上的女性居民提供HPV疫苗免費接種，有關計劃將在2018年5月31日終止，希望在該日期前完成3劑接種的人士，應在2017年11月30日前開始第1劑接種，因第一劑與第三劑最少間距為六個月。

人類乳頭狀瘤病毒疫苗（HPV疫苗）介紹

99%子宮頸癌由不同型別的人類乳頭狀瘤病毒（HPV）引起。現時市面有三種不同價數的HPV疫苗供應，分別為2價、4價及9價HPV疫苗，三種均可以有效預防由高危型HPV16和18引起的子宮頸癌，約可預防全部子宮頸癌的70%，其中9價疫苗除了可以預防HPV16和18外，還可以預防額外5種高危型HPV，分別是HPV31、33、45、52和58型。4價及9價HPV疫苗可同時預防低危型HPV6和11引起的生殖器疣（俗稱椰菜花）。

接種方法和劑量

人類乳頭狀瘤病毒疫苗（HPV疫苗）是採用肌肉注射方式接種，接種劑數按年齡劃分，9至14歲女性接種2劑，15歲以上女性接種3劑。

甚麼時候接種效果最好？

在未有性生活前接種，疫苗的保護效用最大，且越年輕接種，體內產生的抗體水平越高。

疫苗安全嗎？

經大規模臨床測試和上市後的監測，未證實任何死亡或嚴重疾病與疫苗有關，疫苗是安全和有效的，目前多個歐美國家已將人類乳頭狀瘤病毒疫苗納入政府免疫接種計劃中。

疫苗有沒有副作用？

1. 常見副作用與一般疫苗無異，主要為注射位置紅腫、疼痛、低熱，情況輕微且短暫，通常只會維持1至2天。
2. 青春期女性有時會在接種後發生昏厥，這是對注射後的情緒性反應，和疫苗接種無關。

如何預防子宮頸癌？

HPV疫苗可預防約70%-90%子宮頸癌，但仍有10%-30%子宮頸癌可由疫苗不能預防的其他高危型HPV引起，而且疫苗不能治療已受感染人士體內的病毒。即使接種了HPV疫苗，有性生活的女性都應定期進行子宮頸抹片檢查（又稱帕氏抹片），保持良好的健康生活模式及安全性行為的習慣，包括使用安全套、減少性伴侶的數目、避免有多個性伴侶的伴侶，以及避免過早開始性行為。