



麻疹常見問題及解答

(2019 年 4 月 3 日更新)

1. 問題：哪些人需要接種麻疹疫苗？可在哪裡接種？

答：以下人士(包括非澳門居民)需要接種麻疹疫苗，請到住址所屬衛生中心/衛生站接種：

- 1) 到 12 月齡和 18 月齡預約接種日期者；
- 2) 18 月齡至 18 歲以下，未完成 2 劑者；
- 3) 1970 年或之後出生的 18 歲或以上，未曾患麻疹且未曾在 1 歲生日後接種 1 劑者；
- 4) 不具有免疫力且未曾在 1 歲生日後接種麻疹疫苗的醫務人員。

2. 問題：接種麻疹疫苗需要收費嗎？

答：1970 年及之後出生的澳門居民、外僱人員中的醫務人員、托兒所、幼稚園和中小學工作人員免費接種；其他外僱等獲准在澳門長期逗留的人士付費接種，接種費用為每劑澳門幣 50 元。接種時請出示身份證明文件、衛生局使用者卡(俗稱“金卡”)、相關工作證明文件，無衛生局使用者卡請聯絡衛生中心辦理。

3. 問題：到衛生中心接種疫苗的流程是怎樣的？

答：由 2019 年 3 月 28 日開始，除 2 歲以下兒童、托兒所工作的員工和醫護人員無需預約外，其他人士需透過衛生局網上預約接種麻疹疫苗系統 (<https://www.ssm.gov.mo/mmrrs>)、親臨或致電衛生中心及衛生站預約，再根據已預約日期和時間到相應衛生中心及衛生站接種。【備註：可優先接種的托兒所工作人員和醫護人員、需預約接種的外僱人員，接種時需出示工作證件或證明以作識別。】



4. 問題：我是 1 歲以下嬰幼兒的照顧者，可以優先接種麻疹疫苗嗎？

答：衛生局由 2019 年 4 月 2 日起，新增預約通道讓照顧 1 歲以下嬰幼兒的人士包括家務助理優先接種麻疹疫苗。每個有 1 歲以下嬰幼兒的家庭最多登記 **3 名** 照顧者優先接種麻疹疫苗，照顧者須為 1970 年或之後出生未曾感染麻疹且在 1 歲生日後未曾接種麻疹疫苗的人士（包括 1970 年或之後出生的外籍家傭），有關人士需提前在[衛生局網上預約接種麻疹疫苗系統](#)登記，亦可致電或親臨衛生中心登記。登記成功後，須按時到所選的衛生中心或衛生站掛號處報到，經醫護人員評估符合接種條件者，才予接種。

5. 問題：哪些人不需要接種麻疹疫苗？

答：以下的澳門居民不需要接種麻疹疫苗：

- 1) 在 1970 年前出生的人士（絕大部分人已感染，有免疫力）；
- 2) 任何年齡，曾患麻疹人士；
- 3) 1990 年或之後出生已按當時澳門防疫接種計劃接種者。

6. 問題：我在 1970 年前出生，我沒有患過麻疹，亦沒有接種過麻疹疫苗，我可以到衛生中心接種嗎？

答：1970 年前出生的人士，根據流行病學分析及人口血清學調查，絕大部份已感染或接觸過麻疹病毒並已有自然免疫力，無需補種麻疹疫苗。

7. 問題：我是 1970 年後出生的 18 歲以上人士，我在 1 歲後已接種過 1 劑麻疹疫苗，我可以到衛生中心接種嗎？

答：1970 年後出生的 18 歲以上人士，如在 1 歲後接種過 1 劑麻疹疫苗，無需補種麻疹疫苗。

8. 問題：醫護人員現時須接種麻疹疫苗嗎？

答：因應近日本澳新增麻疹輸入及輸入相關病例，其中包括醫務人員受到感染，



衛生局建議不具有免疫力的醫務人員，應確保在 1 歲生日後接種過麻疹疫苗。

9. 問題：我需要到衛生中心要求檢測自己是否有麻疹抗體嗎？

答：在接種麻疹疫苗前無需要檢測抗體，現時檢測麻疹抗體的方法並非百分之百準確，結果陰性亦不能判斷為無免疫力。1970 年或之後出生者，如不知道是否有感染過麻疹，且未能找到接種記錄，一般視作未具免疫力，應補種一劑麻疹疫苗。

10. 問題：自小打了疫苗後是不是到成年後疫苗的抵抗力及免疫力會逐漸減少

答：在幼年時期接種 2 劑疫苗後，97%的接種者體內有抗體，但隨時間推移，部分人士抗體水平可能會有所減少，但體內仍有免疫記憶，身體在下次感染時能快速製造抗體抑制病毒，即使發病，症狀亦很輕微，而且傳染力亦會減弱許多。

11. 問題:我是成年人，我在幼時已打足疫苗的，現在擬到麻疹流行地區旅行，可以到衛生中心加強接種嗎？

答：雖然少部分幼時已打足疫苗的成人仍可能感染麻疹，但一般症狀輕微，而且傳染力弱，一般毋須再接種麻疹疫苗。

12. 問題：我不清楚自己是否已按時接種疫苗，我應如何查到我的接種記錄？

答：可以查閱個人接種手冊(俗稱“針簿”)或親身到住址所屬衛生中心及衛生站向醫護人員查詢，及在有需要時在現場由醫護人員進行評估及接種。此外，衛生局已推出個人健康電子記錄系統，市民可以透過最新版手機應用程式「澳門衛生局資訊站」或衛生局互聯網專頁-「我的健康」服務選項查閱過往曾接種的疫苗記錄等資料，要使用上述功能，居民必須先到相關部門成功申請「一戶通」帳戶以作身份識別及系統登入之用。



13. 問題：麻疹疫苗的禁忌症為何？

答：麻疹為活疫苗，懷孕婦女不能接種，育齡婦女接種後三個月內需要避孕。另外，若對疫苗中的任何成份嚴重過敏、正在患免疫功能受抑制的疾病或接受相關治療，均不能接種。如有疑問，請向醫護人員查詢。

14. 問題：哪些情況應推遲接種麻疹疫苗？

答：正在患急性或發熱性疾病的人士、最近三個月內接受肌注免疫球蛋白或輸注血液、最近 9 個月內接受靜脈輸注免疫球蛋白、或最近 4 周內曾接種其他活疫苗(口服輪狀病毒疫苗除外)，應推遲接種。如有疑問，請向醫護人員查詢。

15. 問題：哺乳期母親可以接種麻疹疫苗嗎？哺乳期母親接種麻疹疫苗後可以通過母乳將抗體傳給嬰兒嗎？

答：哺乳期母親可以接種麻疹疫苗，嬰兒不會因此感染麻疹。哺乳期母親或許能通過母乳有限及短期地將抗體傳給嬰兒，但此抗體不足以保護嬰兒預防麻疹，嬰兒最有效的預防方法是按澳門防疫接種計劃在嬰兒 12 月齡及 18 月齡時各接種 1 劑麻疹疫苗。

16. 問題：目前哪些國家麻疹流行較嚴重？

答：近期本澳鄰近地區麻疹活躍，多個地區均出現麻疹爆發，並有不少死亡個案。世界上很多國家和地區一直持續有麻疹流行，近年歐洲部分發達國家亦因疫苗接種率下降而再出現流行。根據世界衛生組織資料，與本澳往來密切且流行較嚴重的地點如下：

東南亞	南亞	歐洲	中國內地
菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸、印尼、越南、新加坡等	印度、尼泊爾、不丹、馬爾代夫等	希臘、羅馬尼亞、法國、意大利、比利時等	周期性流行，但近期不算嚴重



17. 問題：怎樣預防麻疹？

答：不論身在澳門還是前往流行嚴重地區，都應注意以下事項：

- 按需要接種麻疹疫苗；
- 不要帶未完全免疫的兒童外遊或到旅客聚集的地方；
- 注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、鼻、口；
- 免疫力低者避免前往人多擠迫的地方或醫療場所；
- 出現疑似症狀，應戴上口罩並及時就醫。

18. 問題：麻疹怎樣傳播？

答：麻疹傳染性極強，可通過飛沫傳播和空氣傳播，包括接觸患者的口、鼻分泌物及受污染的物件傳染。

19. 問題：麻疹潛伏期多長？

答：感染至症狀出現一般為 7 至 18 天，可長達 21 天。

20. 問題：麻疹傳染期多長？

答：傳染期為出疹前後 4 天。

21. 問題：患上麻疹，會有甚麼症狀？病死率是多少？

答：以高熱（38°C以上）、口腔粘膜斑（Koplik 斑）、全身性的皮膚斑丘疹、結膜炎、咳嗽和流涕等表現為特徵。通常皮疹於發病後第三天出現，最先見於耳後和面部，漸及頸、軀體及四肢，最後達手掌與足底，持續 4 至 7 天，疹退後有脫屑及色素沉著。麻疹具有很高的傳染性，未打疫苗或未感染者很易受到傳染，在疫苗覆蓋率不高的年代，是兒童極為常見的疾病。麻疹為自限性疾病，大部分病例為輕症，但可出現腦炎、肺炎等併發症，病死率千分之一至百分之一。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

22. 問題：若懷疑自己感染麻疹，應怎麼辦？

答：若懷疑感染麻疹，應戴上口罩儘快就醫，並告訴醫生最近的外遊史或接觸史。同時應注意呼吸道禮儀，避免接觸對麻疹未有免疫的人士及前往人多擠迫的地方。