

新型冠狀病毒感染應變協調中心 2023 年 1 月 30 日消息

曾感染但未完成新冠病毒疫苗接種人士 可在感染後 3 個月按原定劑數完成接種

新型冠狀病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）表示，大部份人士感染新冠病毒後會產生一定免疫力，但免疫力持續時間較短，且對其他新冠病毒變異株的免疫力也相對較低。為使曾感染人士得到更持久保護，參考了各地最新資料調整曾感染新冠病毒人士接種程序，未完成所有接種劑數人士 2 月 1 日起，不必因曾感染新冠病毒而減少接種劑數，即可按未感染人士應接種的劑數，來完成疫苗接種計劃，但須滿足一定的間隔時間。

建議曾感染人士在感染後 3 個月（不少於 12 周，以最後一次新冠病毒核酸或抗原檢測陽性起計），並滿足該年齡組和疫苗接種劑數的既定間隔時間，可繼續接種未完成的劑數；有緊急需要人士（例如前往外地），亦可提早在感染後 28 天（以最後一次新冠病毒核酸或抗原檢測陽性起計）接種疫苗，相關人士需在接種站現場提出申請及簽署知情同意書。

至於各年齡組的新冠疫苗接种劑數及間隔時間的一般建議，可參閱新型冠狀病毒疫苗資訊專頁 <https://www.ssm.gov.mo/covid19vaccine>。應變協調中心強烈呼籲長者或患有慢性基礎病人士儘快完成新冠病毒疫苗初種及加強劑接種，以減少出現重症、住院和死亡的風險。同時，為提高對 Omicron 變異株的保護效力，建議所有人士在接種加強劑時選用二價 mRNA 疫苗。